

# การเลี้ยงเปิดรูป



## การจัดการเปิดรูป 6-12 สัปดาห์

1. ควรให้อาหารที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 12%
2. ควรมีผักหรือหญ้าสับให้กินในช่วงเวลากลางวัน
3. เลี้ยงอยู่ภายในโรงเรือน โดยไม่ปล่อยออกนอกโรงเลี้ยง
4. ควรถ่ายพยาธิครั้งแรกเมื่ออายุ 1-2 เดือน และทุกๆ 6 เดือน
5. จัดทำวัคซีนตามโปรแกรม

## การเลี้ยงเปิดฟอ แม่พันธุ์



การเลี้ยงเปิดไข่แบบปล่อยคลุมฝูงผสมพันธุ์ อัตราส่วนระหว่างพ่อพันธุ์ /แม่พันธุ์ คือ 1 : 5-7 โดยอยู่ภายในบริเวณโรงเรือน ควรให้อาหารที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 16%  
โรงเรือนเลี้ยงเปิดฟอ แม่พันธุ์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. พื้นที่โรงเรือนนอน 1 ตารางเมตร ต่อเปิด 8 - 10 ตัว จัดหาวัสดุรองพื้น เช่น แกลบหรือขี้เลื่อย และควรจัดทำรังสำหรับไข่ ส่วนที่ให้อาหารอยู่ภายในโรงเรือน ส่วนที่ให้น้ำอยู่ด้านนอก



2. พื้นที่ลานด้านนอก ควรมีพื้นที่ 1 - 2 เท่า ของโรงเรือนนอน 1 ตร.ม. / เปิดฟอแม่พันธุ์ 3 - 4 ตัว มีตะข่ายล้อมรอบบริเวณลาน ป้องกันเปิดออกและไม่ให้ศัตรูเข้ารบกวน



ช่วงบ่ายให้หญ้าสับ ขนาด 1-2 ซม. เพื่อเพิ่มวิตามินลดความเครียด หญ้าที่เหมาะสมที่เปิดกินคือหญ้าขน, กระเจี๊ยบ, เศษผัก ถ้านำหญ้าหรือเศษผักจากแหล่งอื่นมาให้เปิดกินควรนำมาล้าง หรือแช่ด้วยต่างทับทิมประมาณ 5-10 นาที

## การเตรียมโรงเรือนก่อนบาสัตว์เข้าเลี้ยง

ก่อนนำสัตว์เข้าเลี้ยงครั้งต่อไป ควรทำความสะอาดโรงเรือนก่อนทุกครั้ง โดยนำเอาวัสดุรองพื้นออก และล้างทำความสะอาดควรฉีดพ่นด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อโรคและโรยด้วยปูนขาวทันที และทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วัน จึงนำสัตว์เข้าเลี้ยง

## การกาวัดขึ้นป้องกันโรค

อายุ	วัคซีนที่ใช้	
	กาฬโรค	อหิวาต์เปิด-ไก่
3-4 สป.	✓	✓
4-12 สป.	✓	✓
ทุกๆ 3 เดือน		✓
ทุกๆ 6 เดือน	✓	
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	



# เปิดบางปะกง



เลขทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ สพพ. 59(1)0605-02

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์



ชื่อท้องถิ่น: เป็ดบางปะกง

ชื่อสามัญ: เป็ดบางปะกง (Bang Pa Kong Duck)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Anas platyrhynchos*

แหล่งที่เลี้ยง: ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
**\*\*ปัจจุบันได้ย้ายฐานการวิจัยและผลิตลูกเป็ดไปที่**

**ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จ.ปราจีนบุรี**

**ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี**

**ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี และ**

**ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์**

ลักษณะประจำพันธุ์สัตว์: **เพศผู้** ขนตามลำตัวสีเทาเข้ม หัว, ปลายปีก, ปลายหาง สีเขียวแก่ ขนปลายหางอ่อนขึ้นข้างบน 2-3 เส้น ปากสีดำแกมน้ำเงิน ขา-เท้า สีส้มอมดำ

**เพศเมีย** ขนตามลำตัวสีเทาอ่อนตลอด ลำตัวปากสีดำแกมน้ำเงิน ขา-เท้า สีส้มอมดำ

## ลักษณะทางเศรษฐกิจ

1. อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก เฉลี่ย  $144 \pm 21$  วัน
2. น้ำหนักตัวเมื่อไข่ฟองแรกเฉลี่ย 1,300 กรัม
3. น้ำหนักไข่เฉลี่ย  $65.02 \pm 4.9$  กรัม
4. น้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย  $55.28 \pm 2.45$  กรัม
5. ผลผลิตไข่เฉลี่ยปีละ  $287 \pm 10$  ฟอง/แม่
6. น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ย เพศผู้  $1,500 \pm 20$  กรัม เพศเมีย  $1,300 \pm 40$  กรัม

## การเลี้ยงเป็ดบางปะกง

### การกกลูกเป็ดบนกรง



1. ขนาดกรงก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 2 ช่อง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1.00 เมตร
2. ขาตั้งกรงห่างจากพื้นดิน 0.50 เมตร
3. มีฝาตระแกรงปิดด้านบน 2 ช่อง
4. ด้านในมีดวงไฟ ขนาด 100วัตต์ 1 หลอด
5. ภาชนะให้อาหาร จำนวน 1 ใบ
6. กระจุกน้ำ จำนวน 1 ใบ
7. เลี้ยงลูกเป็ดแรกเกิดจนถึง 7 วันได้ 200ตัว ควรนำกระจุกน้ำออกจากกรงก ช่วงเย็นเพื่อป้องกันลูกเป็ดเล่นน้ำตอนกลางคืน เพราะอาจจะทำให้ลูกเป็ดเปียกและหนาว เป็นสาเหตุระบบทางเดินหายใจ เช่นโรคหวัด และปอดบวมตาย
8. ควรให้อาหารที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 18%



## กกลูกเป็ดบนดินโดยจานก



1. อุปกรณ์จานกกลูกเป็ด 1 จาน ต่อลูกเป็ดไข่ 500 ตัว
2. แผงกันนก ระยะสัปดาห์แรกควรใช้แผงกันนก

3. ควรนำกระปุกน้ำออกในช่วงตอนเย็น เพื่อป้องกันเป็ดเล่นน้ำในตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้เป็ดหนาวและตายได้
4. ภาชนะอาหาร 1 ภาชนะ/ลูกเป็ด 100 ตัว
5. กระจุกน้ำ 1 กระจุก/ลูกเป็ด 100 ตัว

ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบไหน ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. พื้นที่พอเหมาะสำหรับการกกลูกเป็ดโดยประมาณ 7-10 ตัว/ตารางฟุต
2. ลูกเป็ด อายุ 1-7 วัน แรกต้อง ดูแลเป็นพิเศษ เพราะถ้าไม่มีการกกลูกเป็ดอาจหนาวตาย อุณหภูมิที่ใช้ในการก 1-7 วันแรก ประมาณ 85-90 F แล้วลดลงสัปดาห์ละ 5 F หรือให้สังเกตว่าลูกเป็ดมีการกระจายตัวกันทั่วพื้นที่
3. ต้องหมั่นเปลี่ยนวัสดุรองพื้นอย่าให้แฉะ ถ้าเลี้ยงบนพื้นเล้ากรณีกบนกรง ควรมีผ้าหรือกระสอบที่สะอาดปูพื้น ครั้งหนึ่งของพื้นที่กรง ด้านในมีส่วนมีไฟก และควรเปลี่ยนผ้าหรือกระสอบทุกวัน
4. ช่วงกลางคืนควรเอากระปุกน้ำออก ป้องกันการเปียกชื้นและทำให้ลูกเป็ดเปียกน้ำ อาจทำให้เป็ดปอดบวมตาย
5. ระยะเวลาการกลูกเป็ดในฤดูร้อนจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ส่วนฤดูหนาว 3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย

ส่งจองพันธุ์เป็ดบางปะกงได้ที่

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

5 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

โทร 0 5621 7709, 0 5621 7790